

الحساب التكاملي

1. تكامل دالة متصلة على مجال:

1. تعريف:

لنتكن f دالة متصلة على مجال $[a, b]$ و F دالة أصلية لها على $[a, b]$.

تكامل f من a إلى b هو العدد الحقيقي: $\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$

2. ملاحظات:

- نكتب $\int_a^b f(x) dx = [F(x)]_a^b$
- يمكن تغيير x بأي متغير آخر مثلا: $\int_a^b f(x) dx = \int_a^b f(t) dt = \int_a^b f(u) du = \dots\dots\dots$
- الدالة $F: x \mapsto \int_a^x f(t) dt$ هي الدالة الأصلية للدالة f التي تنعدم في a
- ν قابلة للاشتقاق على E بحيث $\nu(E) \subset I$ و f متصلة على I فإن الدالة $\psi: x \mapsto \int_a^{\nu(x)} f(t) dt$ قابلة للاشتقاق على E ولدينا: $\psi'(x) = \nu'(x) \cdot f(\nu(x))$

3. خاصيات:

$$\int_a^a f(x) dx = 0 \quad \spadesuit$$

$$\int_a^b f(x) dx = -\int_b^a f(x) dx \quad \spadesuit$$

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx \quad \spadesuit$$

4. خطانية التكامل :خاصية :

لتكن f و g دالتان متصلتان على المجال $[a, b]$. لدينا :

$$\int_a^b (f(x) + g(x)) dx = \int_a^b f(x) dx + \int_a^b g(x) dx \quad \color{blue}{\oplus}$$

$$(\alpha \in \mathbb{R}) \quad \int_a^b \alpha f(x) dx = \alpha \int_a^b f(x) dx \quad \color{blue}{\oplus}$$

ii. التكامل و الترتيب :1. خاصية :

لتكن f و g دالتان متصلتان على المجال $[a, b]$. لدينا :

$$\color{blue}{\diamond} \quad \int_a^b f(x) dx \geq 0 \quad \text{فإن } f \geq 0 \text{ على } [a, b]$$

$$\color{blue}{\diamond} \quad \int_a^b f(x) dx \leq 0 \quad \text{فإن } f \leq 0 \text{ على } [a, b]$$

$$\color{blue}{\diamond} \quad \int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx \quad \text{فإن } f \leq g \text{ على } [a, b]$$

2. القيمة المتوسطة :تعريف و خاصية :

▪ لتكن f دالة متصلة على مجال $[a, b]$. العدد $\mu = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$ يسمى القيمة المتوسطة ل f على $[a, b]$

▪ يوجد على الأقل عدد c من $[a, b]$ بحيث : $f(c) = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$

III. تقنيات حساب التكامل :

أ. باستعمال دالة أصلية : سبق الحديث عنها في بداية الدرس

ب. باستعمال المكاملة بالأجزاء :

خاصية :

لتكن u و v دالتان قابلتان للاشتقاق على مجال I حيث u' و v' متصلتان على I و a و b عنصرين من I لدينا :

$$\int_a^b u(x)v'(x)dx = [u(x)v(x)]_a^b - \int_a^b u'(x)v(x)dx$$


ج. باستعمال المكاملة بتغيير المتغير

خاصية و تعريف :

لتكن f دالة متصلة على مجال I و u دالة قابلة للاشتقاق على مجال $[\alpha, \beta]$ (بحيث $u([\alpha, \beta]) = I$)

لدينا : $\int_{u(\alpha)}^{u(\beta)} f(t)dt = \int_{\alpha}^{\beta} f(u(x))u'(x)dx$ (و ذلك بوضع $t = u(x)$)

IV. حساب المساحات :



ليكن المستوى منسوباً إلى معلم متعامد (O, \vec{i}, \vec{j})

وحدة المساحة $u.A$ هي مساحة المستطيل المحدد بالنقطة O

و المتجهتين \vec{i} و \vec{j}

$$1u.A = \|\vec{i}\| \times \|\vec{j}\|$$

خاصية 1:

لتكن f دالة متصلة على مجال $[a, b]$

مساحة الحيز المحصور بين (C_f) و محور الأفاصل و المستقيمين اللذين معادلتاهما $x = a$ و $x = b$ هي :





$$\left(\int_a^b |f(x)| dx \right) u.A$$


خاصية 2:

لتكن f و g دالتان متصلتان على المجال $[a, b]$
مساحة الحيز المحصور بين (C_f) و (C_g) و محور الأفصيل و المستقيمين اللذين معادلتاهما $x = a$ و $x = b$ هي :

$$\left(\int_a^b |f(x) - g(x)| dx \right) u.A$$

حالات خاصة:

مساحة الحيز الملون في الرسم هي:	ملاحظات	رسم توضيحي
$\left(\int_a^b f(x) dx \right) u.A$	f موجبة على المجال $[a, b]$	
$\left(\int_a^b -f(x) dx \right) u.A$	f سالبة على المجال $[a, b]$	
$\left(\int_a^c f(x) dx + \int_c^b -f(x) dx \right) u.A$	<ul style="list-style-type: none"> • f موجبة على المجال $[a, c]$ و • f سالبة على المجال $[c, b]$ 	
$\left(\int_a^b (f(x) - g(x)) dx \right) u.A$	(C_f) يوجد فوق (C_g) على المجال $[a, b]$	

$\left(\int_a^c (f(x) - g(x)) dx + \int_c^b (g(x) - f(x)) dx \right) u.A$	<ul style="list-style-type: none"> • (C_f) يوجد فوق (C_g) على المجال $[a, c]$ و • (C_f) يوجد تحت (C_g) على المجال $[c, b]$ 	
--	--	---


.v حساب الحجم :

خاصية 1:

ليكن (Σ) مجسما محصورا بين المستويين (P_1) و (P_2) اللذين معادلتاهما على التوالي : $z = a$ و $z = b$ ($a < b$)
و لتكن $S(t)$ مساحة تقاطع المجسم (Σ) مع المستوى الذي معادلته $z = t$ حيث $a \leq t \leq b$
إذا كانت الدالة : $t \mapsto S(t)$ متصلة على المجال $[a, b]$ فإن V حجم المجسم (Σ) هو $V = \int_a^b S(t) dt$ بوحدة قياس الحجم.

خاصية 2:

حجم المجسم المولد بدوران (C_f) حول محور الأفاصيل دورة كاملة في مجال $[a, b]$ هو :
حيث : $u.v$: وحدة الحجم $V = \left[\int_a^b \pi (f(x))^2 dx \right] u.v$



٧١. حساب بعض النهايات باستعمال التكامل :خاصية

لتكن f دالة متصلة على مجال $[a, b]$
 نضع $(n \in \mathbb{N}^*)$ $S_n = \frac{b-a}{n} \sum_{k=1}^n f\left(a+k \cdot \frac{b-a}{n}\right)$ و $s_n = \frac{b-a}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f\left(a+k \cdot \frac{b-a}{n}\right)$
 لدينا المتتاليتان (S_n) و (s_n) متقاربتان و $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} s_n = \int_a^b f(t) dt$