

الدوال العددية

دالة عددية لمتغير حقيقي و مجموعة تعريفها

- لتكن $f : x \mapsto f(x)$ دالة عددية لمتغير حقيقي x .
- إذا كان $f(x)$ موجودا (عنصرا من \mathbb{R}) فإننا نقول إن $f(x)$ هي صورة x بالدالة f .
 - مجموعة تعريف دالة f هي مجموعة الأعداد الحقيقية x التي تقبل صورة بالدالة f ونرمز لها بـ D_f .

التمثيل المبياني لدالة عددية

- لتكن f دالة عددية و D_f مجموعة تعريفها و (O, \vec{i}, \vec{j}) معلما في المستوى.
- التمثيل المبياني لدالة f و يسمى أيضا منحنى f ونرمز له بـ C_f و هو مجموعة النقط $M(x, y)$ من المستوى بحيث : $x \in D_f$ و $y = f(x)$

تساوي دالتين

- f و g دالتان عدديتان و D_f و D_g مجموعة تعريفهما.
- نقول إن f و g متساويتان و نكتب $f = g$ إذا و فقط إذا كان $D_f = D_g$ و $f(x) = g(x)$ لكل x من D (حيث $D = D_f = D_g$)

الدالة الزوجية و الدالة الفردية

- لتكن f دالة عددية و D_f مجموعة تعريفها.
- f زوجية إذا و فقط إذا كان لكل x من D_f : $-x \in D_f$ و $f(-x) = f(x)$
 - f فردية إذا و فقط إذا كان لكل x من D_f : $-x \in D_f$ و $f(-x) = -f(x)$

- لتكن f دالة عددية و C_f منحنها في معلم متعامد (O, \vec{i}, \vec{j}) .
- f زوجية يعني أن C_f متماثل بالنسبة لمحور الأرتاب
 - f فردية يعني أن C_f متماثل بالنسبة لأصل المعلم

تغيرات دالة

f دالة عددية و I مجالا ضمن D_f .

- f تزايدية على I يعني أنه لكل عنصرين a و b من I : إذا كان $a \leq b$ فإن $f(a) \leq f(b)$
- f تزايدية قطعا على I يعني أنه لكل عنصرين a و b من I : إذا كان $a < b$ فإن $f(a) < f(b)$
- f تناقصية على I يعني أنه لكل عنصرين a و b من I : إذا كان $a \leq b$ فإن $f(a) \geq f(b)$
- f تناقصية قطعا على I يعني أنه لكل عنصرين a و b من I : إذا كان $a < b$ فإن $f(a) > f(b)$

f دالة عددية و I مجالا ضمن D_f .

- f رتيبة على I يعني f تزايدية أو تناقصية على I .
- f رتيبة قطعا على I يعني f تزايدية قطعا أو تناقصية قطعا على I .

f دالة عددية و D_f مجموعة تعريفها و a و b عنصران مختلفان من D_f

$$\text{العدد } T = \frac{f(b) - f(a)}{b - a} \text{ يسمى معدل تغير } f \text{ بين } a \text{ و } b$$

لتكن f دالة عددية و $T = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$ معدل تغيرها بين عنصرين مختلفين a و b من مجال I ضمن D_f

- ⚡ إذا كان $T \geq 0$ فإن f تزايدية على I
- ⚡ إذا كان $T > 0$ فإن f تزايدية قطعا على I
- ⚡ إذا كان $T \leq 0$ فإن f تناقصية على I
- ⚡ إذا كان $T < 0$ فإن f تناقصية قطعا على I

f دالة عددية مجموعة تعريفها D_f متماثلة بالنسبة للعدد 0

ليكن I مجالا من \mathbb{R}^+ ضمن D_f و I' مائل I بالنسبة للعدد 0

❖ في حالة f دالة زوجية ، لدينا :


- إذا كانت f تزايدية على I فإنها تناقصية على I'
- إذا كانت f تناقصية على I فإنها تزايدية على I'

❖ في حالة f دالة فردية ، لدينا :

f لها نفس منحنى التغيرات على كل من I و I' .


دراسة و تمثيل الدالة $f: x \mapsto ax^2$ ($a \neq 0$)


ليكن a عددا حقيقيا غير منعدم و (O, \vec{i}, \vec{j}) معلما متعامدا في المستوى ، التمثيل المبياني للدالة $x \mapsto ax^2$ يسمى شلجما رأسه O و محوره هو محور الأرتاب .



دراسة و تمثيل الدالة $f: x \mapsto ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$)

نضع $\alpha = \frac{-b}{2a}$
 التمثيل المبياني للدالة $x \mapsto ax^2 + bx + c$ عبارة عن شلجم رأسه $\Omega(\alpha, f(\alpha))$ و محوره هو المستقيم الذي معادلته $x = \alpha$.






دراسة و تمثيل الدالة $f: x \mapsto \frac{a}{x}$ ($a \neq 0$)

ليكن a عددا حقيقيا غير منعدم و (O, \vec{i}, \vec{j}) معلما متعامدا في المسوى ، التمثيل المبياني للدالة $x \mapsto \frac{a}{x}$ يسمى هذلوليا مركزه النقطة O و مقارباها هما محوري المعلم .


a > 0		a > 0																	
<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td style="padding: 2px 10px;">x</td> <td style="padding: 2px 10px;">$-\infty$</td> <td style="padding: 2px 10px;">0</td> <td style="padding: 2px 10px;">$+\infty$</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px 10px;">$f(x)$</td> <td style="padding: 2px 10px;">↗</td> <td style="padding: 2px 10px;">↗</td> <td style="padding: 2px 10px;"></td> </tr> </table>	x	$-\infty$	0	$+\infty$	$f(x)$	↗	↗			<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td style="padding: 2px 10px;">x</td> <td style="padding: 2px 10px;">$-\infty$</td> <td style="padding: 2px 10px;">0</td> <td style="padding: 2px 10px;">$+\infty$</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px 10px;">$f(x)$</td> <td style="padding: 2px 10px;">↘</td> <td style="padding: 2px 10px;">↘</td> <td style="padding: 2px 10px;"></td> </tr> </table>	x	$-\infty$	0	$+\infty$	$f(x)$	↘	↘		
x	$-\infty$	0	$+\infty$																
$f(x)$	↗	↗																	
x	$-\infty$	0	$+\infty$																
$f(x)$	↘	↘																	




دراسة وتمثيل الدالة $f: x \mapsto \frac{ax+b}{cx+d}$

نعتبر الدالة $f: x \mapsto \frac{ax+b}{cx+d}$
 الدالة f تسمى دالة متخاطة
 لدينا $D_f = \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{-d}{c} \right\} =]-\infty, \frac{-d}{c}[\cup]\frac{-d}{c}, +\infty[$
 التمثيل المبياني للدالة $x \mapsto \frac{ax+b}{cx+d}$ عبارة عن هذلول مركزه $\Omega\left(\frac{-d}{c}, \frac{a}{c}\right)$ و مقارباها هما المستقيمان اللذين معادلتاهما :
 $y = \frac{a}{c}$ و $x = \frac{-d}{c}$

العدد $\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc$ يسمى محددة الدالة $f: x \mapsto \frac{ax+b}{cx+d}$




دراسة الدالة $f : x \mapsto \sqrt{x}$



دراسة الدالة $f: x \mapsto \sqrt{x+a}$

نعتبر الدالة $f: x \mapsto \sqrt{x+a}$
لدينا $D_f = [-a, +\infty[$



x	$-a$	$+\infty$
$f(x)$	0	\nearrow